

SIRTAKI

Sirtaki®



SIRTAKI

EFFICACE ERBICIDA PER IL CONTROLLO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI DELLO ZUCCHINO E DI ALTRE COLTURE

NOVITÀ

- **Efficace erbicida** per il controllo delle **principali infestanti a foglia stretta e larga** quali Giavone, Setaria, Portulaca, Poligonacee, Fumaria, Galium, Solanum, Chenopodio, Senecio
- **Flessibile**: utilizzabile sia in pre emergenza/trapianto che in post-emergenza/trapianto e **miscibile** con altri erbicidi
- Agisce per assorbimento radicale e del coleoptile con buona persistenza nel terreno, **ideale per le rinascite di infestanti**



### Composizione

CLOMAZONE 360 g/l

### Formulazione

SOSPENSIONE DI MICROCAPSULE

### N° registrazione

16363 del 26-03-2015

### Indicazioni di pericolo

ATTENZIONE

### Meccanismo d'azione

Codice HRAC F4

### Confezioni

0,3 L (x10), 1 L (x10), 2 L (x6)

COLTURA	INDICAZIONI DI IMPIEGO	
SOIA	0,3 - 0,4 l/ha Pre-emergenza 0,3 l/ha l/ha Post-emergenza precoce	L'azione residuale di SIRTAKI permette di prolungare l'efficacia del diserbo di post soprattutto sulle nascite scalari di Abutilon. Nei trattamenti di post-emergenza SIRTAKI va impiegato in miscela con erbicidi ad azione fogliare.
RISO seminato in asciutta	0,3 - 0,5 l/ha Pre-emergenza Post-emergenza precoce	
RISO seminato in acqua	0,3 - 0,5 l/ha Pre-semina Post-emergenza precoce	
TABACCO	0,4 - 0,5 l/ha Post-trapianto entro 2-4 gg dal trapianto. Trattamento localizzato sulla fila	
PATATA	0,25 - 0,3 l/ha Pre-emergenza Anche dopo la rincalzatura	
<b>NOVITÀ</b> BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	0,15 - 0,20 l/ha In pre-emergenza in terreni di medio impasto ben strutturati Utilizzare dosaggi minori sui terreni più leggeri	
<b>NOVITÀ</b> ZUCCHINO	0,20 - 0,30 l/ha Pre-emergenza o pre-trapianto in suoli limosi 0,15 l/ha Pre-emergenza o pre-trapianto in suoli sabbiosi 0,25 - 0,35 l/ha Pre-emergenza o pre-trapianto in suoli argillosi 0,15 - 0,20 l/ha Post-emergenza o post-trapianto suoli limosi a tutto campo o nell'interfila 0,25 - 0,30 l/ha Post-emergenza o post-trapianto suoli argillosi a tutto campo o nell'interfila	Su zucchini il prodotto è applicabile due volte nella stagione con un intervallo di 14 giorni. Complessivamente nel programma di intervento non superare la dose massima di 0,6 l/ha. In tutte le altre colture deve essere effettuato un solo trattamento per stagione.